Un brote de paperas pone en alerta a tres facultades de la Universitat de València - Levante - 31/10/2018

Un brote de paperas pone en alerta a tres facultades de la Universitat de València

▶ Sanitat detecta 10 casos de parotiditis entre estudiantes de 20 a 21 años de Farmacia, Matemáticas y Química que coincidieron en una fiesta universitaria

RAFEL MONTANER VALÈNCIA

■ Tres facultades del campus de Burjassot de la Universitat de València (UV), las de Farmacia, Matemáticas y Química, han alertado a su alumnado de la detección de un brote de paperas que, por el momento, afecta a 10 alumnos de diferentes cursos y centros. El nexo en común de los alumnos contagiados de parotiditis, según la Conselleria de Sanitat, es que todos ellos coincidieron en una fiesta para universitarios el pasado jueves 27 de septiembre. La UV aclara que se trata de una de las múltiples fiestas de bienvenida universitaria totalmente ajenas a la institución académica que cada inicio de curso organizan diferentes salas de eventos y discotecas de la ciudad de València.

Desde la Conselleria de Sanitat informan que «a fecha de hoy -por ayer- se han confirmado 6 casos de parotiditis entre jóvenes universitarios de 20 y 21 años, con inicio de síntomas entre el 14 y 19 de octubre, y otros 4 casos se encuentran en estudio». Es decir, son alumnos de tercero y segundo curso de grado, nacidos por tanto entre los años 1997 y 1999.

«Todos estaban vacunados»

«Los seis casos confirmados se encontraban correctamente vacunados con triple vírica», subraya Sanitat. Por tanto, este brote estaría relacionado con el repunte que han experimentado los casos de paperas en los últimos años entre la población joven debido a la falta de efectividad de una vacuna que se administró desde la mitad de la década de los años ochenta hasta que se retiró en 1999. Se trata de la llamada cepa Rubini, cuya protección apenas resultó efectiva al 50 %.

Los decanatos de las tres facultades, siguiendo las instrucciones del servicio de Epidemiología del Centro de Salud Pública de la conselleria, han remitido a todos sus alumnos una circular con las pautas a seguir ante el brote de esta enfermedad epidémica. En algunos centros, como la Facultat de Química, la carta se ha remitido además a todo el Personal Docente e Investigador (PDI) y al Personal de Administración y Servicios (PAS). «No se trata de crear alarma alguna, sino de informar y tomar las medidas adecuadas», explica la decana de Química, Adela Mauri, en el correo masivo.

En la carta, el jefe de la Sección de Epidemiología de la conselleria, Antonio Salazar, destaca que la parotiditis «es una enfermedad epidémica que se presenta en ondas cíclicas cada 4-5 años y se caracteriza por la aparición de fiebre, hinchazón y dolor a la palpación de una o varias glándulas salivares, por lo general las parótidas». El periodo de incubación oscila entre 16 a 18 días con un rango de 14-25 días. De hecho, según Sanitat, en los seis casos confirmados «el inicio de los síntomas se dio entre el 14 y 19 de octubre», 18 días después de la fiesta para universitarios.

«La protección frente a las paperas la confiere el padecimiento de la enfermedad (haber pasado la parotiditis anteriormente) o la vacunación con la llamada triple vírica (Sarampión, Rubéola y Parotiditis)».

Por ello, Sanitat recomienda a los universitarios que «comprueben su protección frente a esta enfermedad y en caso de que no hayan pasado la paperas o estén vacunados frente a ella, acudan a su centro de salud de atención primaria para que, salvo contraindicación, le sea administrada una dosis de triple vírica.

Nueve días sin ir a clase

«Ante la aparición de síntomas compatibles con la enfermedad debe acudir a su médico y se recomienda aislamiento respiratorio de los casos durante 9 días después de la aparición de la parotiditis, por lo que durante este tiempo los casos afectados no deben acudir a clase», concluye Sanitat.



La Facultat de Matemáticas, en el campus de Burjassot. EDUARDO RIPOLL

Hijos de la Rubini, una vacuna poco efectiva que se usó hasta 1999

▶ **Detrás del aumento de los casos de paperas entre jóvenes de 20 a 35 años está la baja eficacia de la vacuna que recibieron en su día, ya fuera en su primera dosis establecida a los 15 meses de edad o la segunda, la de refuerzo, que en 1994 se ponía a los 11 años de edad (ahora se pone entre los 3 y 4 años). Según la Dirección General de Salud Pública, en los años 90 se comercializó una vacuna contra las paperas que utilizaba un tipo de cepa concreta, la Rubini, tras retirar una anterior por sus efectos secundarios. En 1998 dos brotes de paperas, uno en Manacor y otro en Almoradí encendieron las alarmas ya que la gran mayoría de afectados habían sido vacunados. Tras poner en cuestión su efectividad, las autoridades sanitarias decidieron retirar este tipo de vacuna a partir de 1999. De la protección esperada, la cepa «solo resultó ser efectiva al 50 %», según el presidente de la Asociación Española de Vacunología, Amós José García. v. SALINAS** VALÈNCIA