

Análisis de la opinión de la población general sobre la Violencia Obstétrica y factores relacionados

Alberto Castro Porcel

Residente de Enfermería especialidad Obstétrico Ginecológica

Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva



1. INTRODUCCIÓN

- La violencia obstétrica (VO) se ha convertido en un **problema grave de salud pública**. Se define como maltrato, abuso, negligencia o discriminación que una mujer experimenta durante el proceso de embarazo, parto y postparto.
- En la actualidad la VO **sigue sin ser aceptada**. La mayoría de profesionales no son conscientes de ejercerla y una gran parte de la sociedad desconoce sus repercusiones.
- Existe un anteproyecto de Ley de salud sexual y reproductiva que **responsabiliza al Estado** frente a la VO, en el se refuerza la obligación de los profesionales de proporcionar una atención respetada.

2. OBJETIVOS

Objetivo general

- Conocer la opinión de la sociedad sobre la VO.

Objetivos secundarios

- Explorar la opinión de la muestra sobre que profesionales son los que más la ejercen.
- Estudiar la prevalencia de la VO en la muestra del estudio.


3. MATERIAL Y MÉTODOS

- Se realizó un estudio observacional descriptivo, en el que se midió distintas variables a través de un cuestionario auto administrado.
- Dicho cuestionario se publicó a través de las redes sociales del autor.
- El estudio se basó en la opinión voluntaria de los participantes, utilizó datos anonimizados que preservaron la privacidad y confidencialidad, por eso no necesitó aprobación de un comité ético.

4. RESULTADOS

- Variables Sociodemográficas
 - 236 personas respondieron al cuestionario
 - La media de edad fue de **31 años**.
 - El nivel de estudios de la muestra:
 - **85,6%** tenían estudios universitarios.
 - Un **57%** habían sido madres o padres.
 - Un **65%** eran sanitarios.



An illustration in the background shows a pregnant woman in profile, facing right. A healthcare professional, possibly a midwife or doctor, is shown from the waist up, wearing a white coat and gloves, examining the woman's abdomen. The style is a soft, watercolor-like drawing with a warm, yellowish-orange color palette.

- **Variables de estudio:**

- Un 93,6% reconocía saber que es la VO.
- Un 73,8% conocía o había sufrido VO.
- Según los encuestados los profesionales que más la ejercen son Matronas, Ginecólogos y TCAEs.
- Un 91,5% creían que el sistema sanitario tenía responsabilidad en la VO.
- Un 95,3% opinaba que una mayor formación de los profesionales disminuiría la VO.
- Un 81,3% suponía que la VO disminuiría si las mujeres tuviesen más conocimiento sobre maternidad.

5. DISCUSIÓN RESULTADOS

- A pesar de que un gran número decían saber que era la VO, la acotaban al proceso de maternidad y al paritorio en particular.
- Un gran porcentaje de la muestra respondió que el sistema sanitario tiene responsabilidad en dicha violencia y que esta disminuiría con más formación y recursos.
- Desde el colectivo profesional se debe trabajar para tratar de dar voz a las víctimas de VO, ya que en la mayoría de ocasiones estas no encuentran el apoyo que necesitan.

6. CONCLUSIONES

- Si se consigue dar mayor visibilidad a esta problemática, los gestores de salud se verán obligados a tomar medidas más directas y efectivas.
- Estas medidas disminuirían potencialmente la VO y la atención a las mujeres sería percibida por estas como más satisfactoria.